

# **FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES**



**FASCÍCULO 194**

**FAMILIA COMPOSITAE**

**TRIBU INULEAE**

**Por Rosario Redonda-Martínez**

**Instituto de Ecología A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Pátzcuaro, Michoacán, México**

**2016**

# FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES

Fascículo 194

octubre de 2016

## COMPOSITAE

### TRIBU INULEAE\*

Por Rosario Redonda-Martínez  
Instituto de Ecología, A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Pátzcuaro, Michoacán

Plantas herbáceas, arbustos u ocasionalmente árboles, a menudo aromáticos; tallos erectos o decumbentes, ramas pilosas, puberulentas, tomentulosas, tomentosas o piloso-glandulares; hojas alternas o a veces casi opuestas, simples, enteras a pinnatisectas; cabezuelas dispuestas en cimas, corimbos, panículas o solitarias, heterógamas

---

\* Referencias: Anderberg, A. A. Taxonomy and phylogeny of the tribe Plucheeae (Asteraceae). *Pl. Syst. Evol.* 176: 145-177. 1991.

Anderberg, A. A. Inuleae. In: Funk, V. A., A. Sussana, T. F. Stuessy & R. J. Bayer (eds.). *Systematics, evolution and biogeography of the Compositae*. International Association for Plant Taxonomy. Vienna. pp. 667-680. 2009.

Anderberg, A. A. & P. Eldenäs. Tribe Inuleae. In: Kadereit, J. W. & C. Jeffrey (eds.). *The families and genera of vascular plants. Flowering plants Eudicots Asterales*, Vol. VIII. Springer Verlag. Wien-Berlin. pp. 165-192. 2007.

Anderberg, A. A., P. Eldenäs, R. J. Bayer & M. Endglund. Evolutionary relationships in the Asteraceae tribe Inuleae (incl. Plucheeae) evidenced by DNA sequences of *ndhF*; with notes on the systematic positions of some aberrant genera. *Org. Divers. Evol.* 5: 135-146. 2005.

Chen, Y. S. & A. A. Anderberg. Inuleae. In: Wu, Z. Y., P. H. Raven & D. Y. Hong (eds.). *Flora of China*. Vol. 20-21 (Asteraceae). Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis). pp. 820-850. 2011.

Eldenäs, P., M. Källersjö & A. A. Anderberg. Phylogenetic placement and circumscription of tribes Inuleae s. str. and Plucheeae (Asteraceae): evidence from sequences of chloroplast gene *ndhF*. *Molec. Phylogen. Evol.* 13: 50-58. 1999.

Funk, V. A., A. Sussana, T. F. Stuessy & H. Robinson. Classification of Compositae. In: Funk, V. A., A. Sussana, T. F. Stuessy & R. J. Bayer (eds.). *Systematics, evolution and biogeography of the Compositae*. International Association for Plant Taxonomy. Vienna. pp. 171-189. 2009.

McVaugh, R. Compositae. In: Anderson, W. R. (ed.). *Flora Novo-Galiciana*. The University of Michigan Press. Ann Arbor, Michigan. 12: 1-1157. 1984.

Medina-Lemos, R. & J. L. Villaseñor. Asteraceae. Tribu Plucheeae. In: Medina-Lemos, R., J. G. Sánchez-Ken, A. García-Mendoza & S. Arias Montes (eds.). *Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán* 78: 1-13. 2010.

Villaseñor, J. L. & E. Ortiz. La familia Asteraceae en la Flora del Bajío y de regiones adyacentes. *Acta Bot. Mex.* 100: 259-291. 2012.

o a veces homógamas; involucros cilíndricos, campanulados o turbinados, con brácteas dispuestas en varias series, graduadas o casi iguales, libres, receptáculo plano a convexo, desnudo o paleáceo; flores periféricas, de estar presentes, radiadas, filiformes o tubulares, femeninas y fértiles, comúnmente amarillas, otras veces rosadas, moradas u ocreleucas, ocasionalmente en mayor número que las flores centrales, ramas del estilo filiformes, lisas; flores centrales tubulosas, hermafroditas o funcionalmente masculinas, amarillas, rosadas o moradas; anteras con apéndices apicales libres, ovados o triangulares a lineares; ramas del estilo filiformes, papilosas; cipselas prismáticas, costilladas, anguladas, teretes, claviformes o fusiformes, pilosas, glandulares o piloso-glandulares, con vilano 1-seriado, de cerdas capilares barbeladas y/o de escamas alargadas, libres, rara vez formando una corona anular o ausente.

La tribu Inuleae es un conjunto monofilético relacionado con las tribus Athroismeae y Heliantheae s.l., es el grupo basal de la subfamilia Asteroideae. En Inuleae se reconocen dos linajes, el primero Inuleae-Inulinae, se caracteriza por la presencia de cristales de oxalato de calcio en la epidermis de la cipsela; el segundo Inuleae-Plucheinae, tiene estilos con ramas obtusas, tricomas por debajo del punto de bifurcación y carece de cristales en la cipsela (Anderberg, 2009). Dado que los géneros de la antiguamente propuesta tribu Plucheeae presentes en la zona del Bajío pertenecen a linajes distintos, el presente tratamiento taxonómico se realiza considerándolos como miembros de la tribu Inuleae, a semejanza de lo que se hizo en el listado florístico de la región (Villaseñor y Ortiz, 2013). La tribu incluye 62 géneros y alrededor de 700 especies a nivel mundial; en México se conocen 4 géneros y 12 especies. Para el área de estudio, se registran dos géneros, tres especies y dos categorías infraespecíficas.

- 1 Planta herbácea perenne; hojas ovadas, sésiles, con indumento piloso-glandular; flores blanquecinas o rosadas ..... *Blumea*
- 1 Planta arbustiva aromática; hojas elípticas o lanceoladas, pecioladas o sésiles, mayormente con indumento tomentoso; flores rosadas o moradas ..... *Pluchea*

## BLUMEA DC.\*

Plantas herbáceas perennes, arbustos o árboles pequeños; hojas alternas, sésiles o cortamente pecioladas, ovadas, elípticas o elíptico-ovadas;

---

\* Referencia: Pornpongrungrueg, P., F. Borchsenius, M. Englund, A. A. Anderberg & M. H. G. Gustafsson. Phylogenetic relationships in *Blumea* (Asteraceae: Inuleae) as evidenced by molecular and morphological data. Pl. Syst. Evol. 269: 223-243. 2007.




cabezuelas dispuestas en inflorescencias en forma de cimas o corimbos; involucro campanulado, las brácteas dispuestas en 3 a 4 series, graduadas, receptáculo convexo, glabro, desnudo; flores periféricas filiformes, femeninas, numerosas, rosadas o moradas; flores del disco numerosas, aunque en menor cantidad que las periféricas, hermafroditas o funcionalmente masculinas, las corolas tubulares, rosadas o blanquecinas; anteras blanquecinas, triangulares o lanceoladas en el ápice, caudadas en la base; ramas del estilo redondeadas en el ápice, papilosas; cipselas prismático-elipsoides, 6-8-costilladas, pardas o negras, piloso-glandulares, vilano de cerdas capilares barbeladas.

Género con alrededor de 100 especies con distribución principalmente en los trópicos del viejo mundo; se relaciona con *Caesulia*, *Duhaldea* y *Pentanema* p.p. El género fue descrito por De Candolle para incluir en él algunas especies de *Conyza* con características excepcionales, entre las que destacan la presencia de líneas estigmáticas apicales y las anteras caudadas, además de los filarios conspicuamente graduados y el vilano con pocas cerdas capilares. De Candolle dividió el género en dos series: *Apterae* que presenta anteras caudadas e incluye cerca de 86 especies y *Caulopterae* sin anteras caudadas, en la cual agrupó nueve especies. Para la región de estudio se conoce una especie.

**Blumea viscosa** (Mill.) V.M. Badillo, Revista Fac. Agron. (Maracay) 7(3): 9. 1974. *Conyza viscosa* Mill., Gard. Dict. (ed. 8) *Conyza* no. 8. 1768. *Pseudoconyza viscosa* (Mill.) D'Arcy, Phytologia 25(5): 281. 1973.

Planta herbácea perenne de 15 a 30 cm de alto; ramas tomentulosas, piloso-glandulares; peciolo ausente, láminas foliares de 1.2 a 2.5 cm de largo, de 0.5 a 1.1 cm de ancho, agudas en el ápice, cuneadas o a veces decurrentes en la base, margen dentado, verdes y piloso-glandulares en ambas superficies; cabezuelas dispuestas en cimas o corimbos laxos, en los extremos de las ramas, pedúnculos individuales de 0.4 a 2.5 cm de largo, piloso-glandulares; involucro campanulado, de 6.9 a 7.6 mm de alto, las brácteas 42 a 50, 4-seriadas, imbricadas, lanceoladas o linear-lanceoladas, ápice agudo, piloso-glandulares; flores periféricas 120 a 150(182), filiformes, flores del disco 12 a 18, las corolas tubulares, de 5.7 a 6.2 mm de largo, rosadas, lóbulos papilosos en el ápice; anteras de 2.3 a 2.5 mm de largo, insertas, rosadas; ramas del estilo teretes, obtusas y papilosas en el ápice; cipselas de 0.6 a 0.8 mm de largo, negras o a veces pardas, pilosas; vilano de 10 a 12 cerdas capilares de 4.2 a 5 mm de largo.

Elemento escaso en la región de estudio, solo registrado de terrenos cenagosos, salobres a orilla del lago de Cuitzeo, Michoacán. Alt. 1800 m. Colectado en floración y fructificación en mayo.




*Blumea viscosa* (Mill.) V.M. Badillo. A. hábito; B. cabezuela; C. flor del disco; D. bráctea del involucre; E. cipsela; F. detalle de estilo y ramas del estigma; G. androceo; H. flor periférica. Ilustrado por Albino Luna y reproducido de Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán 78: 7. 2010, con autorización del editor.

Especie conocida de México a Bolivia, así como de las Antillas; también de África y Asia. Sin., Nay., Jal., Mich., Méx., Mor., Ver. (tipo: *W. Houston s.n.* (BM!)), Gro., Oax., Chis., Centroamérica; Sudamérica; las Antillas; África; Asia.

Planta poco colectada debido a la distribución que presenta en zonas inundables o cercanas a cuerpos de agua y su asociación con elementos de vegetación secundaria, por lo cual no se considera que presente riesgo de extinción.

**Michoacán:** cerca del balneario La Ciénega, próximo a San Agustín del Maíz, municipio de Copándaro, *J. Rzedowski 39654* (ENCB, IEB, MEXU).





## PLUCHEA Cass.\*

Arbustos aromáticos o plantas herbáceas perennes; hojas alternas, corta o largamente pecioladas, a veces sésiles, ovadas, elípticas o linear-lanceoladas; cabezuelas dispuestas en inflorescencias en forma de cimas, corimbos o panículas; involucreo campanulado o hemisférico, las brácteas dispuestas en 3 a 4 series, graduadas, receptáculo convexo, glabro, desnudo; flores periféricas filiformes, femeninas, numerosas, rosadas o moradas; flores del disco numerosas, aunque en menor cantidad que las periféricas, hermafroditas o funcionalmente masculinas, las corolas tubulares, rosadas o moradas; anteras exsertas, blanquecinas, lanceoladas en el ápice, sagitadas en la base; ramas del estilo redondeadas en el ápice, papilosas; cipselas fusiformes, 6-8-costilladas, pardas o negras, piloso-glandulares, vilano de cerdas capilares barbeladas.

Género con alrededor de 100 especies con distribución principalmente en los trópicos del viejo mundo; se relaciona estrechamente con *Tessaria*, aunque también ha sido vinculado con *Berthelotia*, *Cylindrocline*, *Doellia*, *Monarrhenus* y *Tecmarsia*. Para la región de estudio se conocen dos especies.

- 1 Hojas pecioladas, base no decurrente sobre el tallo, láminas elípticas, margen entero; involucreo hemisférico ..... *P. carolinensis*
- 1 Hojas sésiles, base decurrente sobre el tallo, láminas linear-lanceoladas, margen dentado; involucreo campanulado ..... *P. salicifolia*

***Pluchea carolinensis*** (Jacq.) G. Don, Hort. Brit. (ed. 3) p. 350. 1839. *Conyza carolinensis* Jacq., Icon. Pl. Rar. 3: 585. 1788

Nombres comunes registrados fuera la zona de estudio: balagasana (lengua zapoteca) candelón, canela, canelilla, canelón, flor de Santa María, guizh-cànÉl (lengua zapoteca), hierba de clavo, kaxnan may te' (lengua tzeltal), lengua de

---

\* Referencias: Blake, S. F. Nine new American Asteraceae. J. Wash. Acad. Sci. 21: 325-336. 1931.  
Britten, J. The Conyzas of Miller's dictionary. ed. 8. J. Bot. 36: 51-55. 1898.  
Gillis, W. T. *Pluchea* revisited. Taxon 26: 581-591. 1977.  
Kahn, R. & C. E. Jarvis. The correct name for the plant known as *Pluchea symphytifolia* (Miller) Gillis (Asteraceae). Taxon 38: 659-662. 1989.  
Nesom, G. L. New species, new sections and a taxonomic overview of American *Pluchea* (Inuleae, Asteraceae). Phytologia 67: 158-167. 1989.  
Robinson, H. & J. Cuatrecasas. The generic limits of *Pluchea* and *Tessaria* (Inuleae, Asteraceae). Phytologia 27: 277-285. 1973.  
Villaseñor, J. L. & J. A. Villarreal. El género *Pluchea* (familia Asteraceae, tribu Plucheeae) en México. Rev. Mex. Biodivers. 77: 59-65. 2006.

buey, naranjillo, salve ay (lengua popoluca), salvia, Santa María, ya canel (lengua zapoteca).

Arbusto aromático de 0.5 a 3 m de alto; ramas tomentosas, tomentulosas o pilosas, rara vez glabrescentes con la edad; peciolo de 1 a 1.3 cm de largo, tomentosos, láminas foliares elípticas, de 8.7 a 11.6 cm de largo, de 3 a 3.7 cm de ancho, obtusas y mucronadas en el ápice, agudas en la base, margen entero, verdes y piloso-glandulares en el haz, amarillentas o blanquecinas y tomentuloso-glandulares en el envés; cabezuelas agrupadas en corimbos densos en los extremos de las ramas, pedúnculos individuales de 0.5 a 1.2 cm de largo, tomentosos, con bracteolas subuladas, tomentosas, de 0.8 a 3.2 mm de largo; involucreo hemisférico, de 4.1 a 5.3 mm de alto, las brácteas 42 a 46, 4 a 5-seriadas, imbricadas, ovadas, verdosas con tintes morados o moradas, ápice agudo, piloso-glandulares; flores periféricas filiformes, femeninas, 150 a 200, flores del disco 30 a 40, las corolas tubulares, de 4.1 a 4.5 mm de largo, rosadas o moradas, lóbulos glandulares en el ápice; anteras de 1.8 a 2 mm de largo; ramas del estilo teretes, obtusas y pilosas en el ápice; cipselas de 0.53 a 0.8 mm de largo, negras, pilosas; vilano de 8 a 12 cerdas capilares barbeladas, de 3.4 a 4 mm de largo.

Elemento escaso en la región de estudio, principalmente en matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosque de galería y bosque mesófilo de montaña, en el noreste de Guanajuato, así como en el noreste y centro de Querétaro. Alt. 1150-2000 m. Colectado en floración y fructificación en febrero a abril y en agosto, aunque probablemente florezca y fructifique durante todo el año.


Especie conocida de Estados Unidos a Perú y Guyana, incluyendo las Antillas, así como de Asia. E.U.A. (lectotipo: lámina 585, Icones Plantarum Rario-rum, Jacquin, basada en una planta de Carolina); B.C.S., Sin., Chih., Coah., N.L., Tamps., Zac., S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Jal., Col., Mich., Méx., Mor., Pue., Ver., Gro., Oax., Tab., Chis., Camp., Yuc., Q.R.; Centroamérica; Sudamérica; las Antillas; Asia.

Planta poco colectada en la zona de estudio, sin embargo, no se considera que presente riesgo de extinción.


**Guanajuato:** Misión de Santa Rosa, municipio de Xichú, *E. Pérez* y *E. Carranza* 2893 (MEXU); 1 km del poblado El Álamo, sobre la carretera vecinal San Luis de la Paz - Victoria - Xichú, municipio de Xichú, *J. I. Calzada* 25488 (FES-I, MEXU).

**Querétaro:** 4 km de Arroyo Seco, sobre la carretera a Conzá, municipio de Arroyo Seco, *E. Carranza* 1490 (ENCB, MEXU); al S de Tanchanaquito, La Isla, municipio de Jalpan, *L. López* 536 (MEXU); curva de La Palmilla, 5 km al NE de La Vuelta, municipio de Landa, *E. González* 400 (MEXU); 6 km al SO de Santa Inés, municipio de Landa, *R. Fernández* 2769 (ASU, ENCB, MEXU); 10 km al S de Agua Zarca, sobre brecha a Pisaflores, municipio de Landa, *R. Fernández* 3871 (ENCB);





*Pluchea carolinensis* (Jacq.) G. Don. A. rama con inflorescencias; B. cabezuela; C. bráctea externa del involucre; D. bráctea interna del involucre; E. cipsela; F. flor del disco y detalle de estigmas; G. estilo; H. androceo; I. flor periférica. Ilustrado por Albino Luna y reproducido de Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán 78: 11. 2010, con autorización del editor.



11 km a N de Peña Blanca, ladera E del cerro La Tembladera, municipio de Peñamiller, *S. Zamudio* 2706 (ENCB, MEXU); 6 km al S de Peña Blanca, municipio de Peñamiller, *S. Zamudio* 3651 (ENCB, MEXU); Junta de las Higueras en las riberas del río Extoraz, municipio de Peñamiller, *R. Hernández* 10471 (IEB, MEXU); fondo del cañón de Misión de Bucareli, municipio de Pinal de Amoles, *Y. Pantoja* 199 (MEXU, QMEX); ladera N de La Cañada, cerca del manantial, municipio de El Marqués, *A. Cabrera* 178 (IEB, QMEX); between Tolimán and Pilón, 45-50 mi by road NE of Querétaro, municipio de Tolimán, *R. McVaugh* y *R. L. Wilbur* 10372 (MEXU, MICH); Maconi, municipio de Cadereyta, *J. R. Bruff* 1038 (MEXU).

La historia taxonómica de esta especie ha sido compleja; algunos ejemplares de *P. carolinensis*, han sido identificados como *P. odorata* (L.) Cass. o *P. purpurascens* (Sw.) DC., sin embargo, el primer nombre corresponde a otra planta con hábito herbáceo y el segundo es su sinónimo. Por otra parte, Gillis (1977) propuso

el binomio *P. symphytifolia* (Mill.) Gillis, con el cual se reconoció a *P. carolinensis* durante algún tiempo; no obstante, Kahn y Jarvis (1989) analizaron el material tipo y determinaron que *P. symphytifolia* en realidad corresponde a *Neurolaena lobata* (L.) Cass. (de la tribu Heliantheae).

Fuera de la zona de estudio se le registran usos medicinales.

**Pluchea salicifolia** (Mill.) S.F. Blake, Contr. U.S. Natl. Herb. 26(5): 237. 1930.  
*Conyza salicifolia* Mill., Gard. Dict. (ed. 8) *Conyza* no. 6. 1768. *Baccharis adnata* Humb. & Bonpl. ex Willd., Enum. Hort. Berol. p. 870. 1809. *P. adnata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Mohr, Contr. U.S. Natl. Herb. 6: 790. 1901.

Arbusto aromático de 0.5 a 2 m de alto; ramas aladas, tomentosas o tomentulosas, ocasionalmente glabrescentes; peciolo ausentes; láminas foliares linear-lanceoladas, de 5 a 13.2 cm de largo, de 0.5 a 1.6 cm de ancho, agudas en el ápice, decurrentes en la base, margen dentado, verdes, tomentulosas, pilosas o tomentosas glandulares, a veces glabrescentes, en ambas superficies o tomentosas solo en el envés; cabezuelas agrupadas en corimbos densos en los extremos de las ramas, pedúnculos individuales de 0.3 a 2.4 cm de largo, pilosos o tomentosos, rara vez glabrescentes, con bracteolas lanceoladas, pilosas o tomentosas, ocasionalmente glabrescentes, de 0.8 a 3.2 mm de largo; involucreo campanulado, de 3 a 4.7 cm de alto, las brácteas 42 a 60, 4 a 5-seriadas, imbricadas, lanceoladas o linear-lanceoladas, verdosas con tintes morados o moradas, ápice agudo, piloso-glandulares, rara vez tomentuloso-glandulares o glabrescentes; flores periféricas filiformes, femeninas, 200 a 250, flores del disco 8 a 15, las corolas tubulares, de 3.5 a 5 mm de largo, rosadas o moradas, lóbulos glandulares en el ápice; anteras de 2.1 a 2.9 mm de largo; ramas del estilo teretes, obtusas y pilosas en el ápice; cipselas de 0.67 a 1.06 mm de largo, negras, pilosas; vilano de 8 a 12 cerdas capilares barbeladas, de 2.6 a 4.6 mm de largo.

Especie polimorfa conocida de México a Centroamérica. Blake (1931) reconoció tres variedades, de las cuales dos se encuentran en la zona de estudio.

- 1 Ramas, envés de las hojas y brácteas del involucreo piloso-glandulares, a veces glabrescentes ..... *P. salicifolia* var. *salicifolia*
- 1 Ramas tomentosas; envés de las hojas tomentuloso; brácteas del involucreo tomentuloso-glandulares ..... *P. salicifolia* var. *canescens*

**Pluchea salicifolia** (Mill.) S.F. Blake var. **salicifolia**

Nombre común registrado en la zona: Santa María delgada.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: yucu ventidura.



Arbusto aromático de 0.6 a 1.5 m de alto; ramas pilosas, ocasionalmente glabrescentes; láminas foliares piloso-glandulares, a veces glabrescentes en ambas superficies, rara vez tomentuloso-glandulares en el envés (*E. Ventura* y *E. López* 7937); pedúnculos individuales pilosos, rara vez glabrescentes, con bracteolas lanceoladas, pilosas, ocasionalmente glabrescentes; involucro con brácteas verdes con tintes morados, rara vez moradas, piloso-glandulares, a veces glabrescentes.


Elemento relativamente abundante en la región de estudio, principalmente en bosque de galería, bosque tropical caducifolio y matorral xerófilo, creciendo a orilla de ríos, en Guanajuato y Querétaro. Alt. 250-1900 m. Colectado en floración y fructificación de febrero a octubre, aunque posiblemente florezca y fructifique durante todo el año.

Taxon conocido de casi todo el país, así como de Guatemala. Son., Sin., Chih., N.L., Tamps., Dgo., S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Nay., Jal., Col., Mich., Méx., Mor. (tipo de *B. adnata*: *A. Humboldt* y *A. Bonpland* s.n. (B)), Pue., Ver. (tipo: *W. Houston* s.n. (BM!)), Gro., Oax., Chis.; Centroamérica.

Planta común en la zona de estudio, por lo que no presenta riesgo de extinción, debido a su amplia distribución.

**Guanajuato:** Santa Rosa, 12 km al SO de Xichú, municipio de Xichú, *E. Ventura* y *E. López* 6582 (ENCB, IEB, MEXU); Río Bajo, municipio de Xichú, *E. Ventura* y *E. López* 7937 (ENCB, IEB, MEXU); El Charco del Ingenio, municipio de San Miguel de Allende, *W. L. Meagher* 3104 (IEB); 3121 (IEB); San Miguel de Allende, un escalón arriba del Cañón del Ingeniero, municipio de San Miguel de Allende, *J. Kishler* 591 (MEXU).

**Querétaro:** al S de Tanchanaquito, Los Rejalgares, municipio de Jalpan, *L. López* 537 (IEB, MEXU); orilla del río Santa María, La Isla, 6 km al N de El Carrizal, municipio de Jalpan, *R. Fernández* 4502 (ENCB); Paso del Tepeguaje, río Moctezuma, al S de Landa, municipio de Landa, *A. Herrera* 65 (IEB, MEXU); río Moctezuma, al S de Matzacintla, municipio de Landa, *E. Carranza* 1613 (ENCB, IEB, MEXU); Tangojón, orilla del río Moctezuma, municipio de Landa, *H. Díaz* y *S. Zamudio* 4615 (IEB); alrededores de Peñamiller, municipio de Peñamiller, *S. Zamudio* 2019 (IEB); Junta de las Higueras en la ribera del río Extoraz, cerca de Higueras, municipio de Peñamiller, *R. Hernández et al.* 10472 (EBUM, ENCB, MEXU); 1 km al S de Escanelilla, sobre la carretera a Pinal de Amoles, municipio de Pinal de Amoles, *J. Rzedowski* 43383 (ENCB, IEB); Ahuacatlán, municipio de Pinal de Amoles, *R. Hernández et al.* 9278 (MEXU); cañón del río Moctezuma, bajando por la ventana 2, municipio de Cadereyta, *S. Zamudio* 13356 (IEB); La Solana, municipio de Cadereyta, *M. A. Salcedo* 126 (IEB); Maconí, municipio de Cadereyta, *R. Fernández* 2857 (ENCB, MEXU, NY); El Batán, municipio de Villa Corregidora, *E. Argüelles* 735 (ENCB, MEXU); 2 km al N de San Francisco, cañón al pie de la presa El Batán, municipio de Villa Corregidora, *L. Hernández* 3507 (MEXU, QMEX).



***Pluchea salicifolia* (Mill.) S.F. Blake var. *canescens* (A. Gray) S.F. Blake, J. Wash. Acad. Sci. 21: 328. 1931. *P. subdecurrens* Cass. var. *canescens* A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 5: 182. 1861.**

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: jara peluda.

Arbusto aromático de hasta 2 m de alto; ramas tomentosas; láminas foliares tomentulosas o tomentosas en ambas superficies; pedúnculos individuales tomentosos, con bracteolas lanceoladas, tomentosas; involucro con brácteas moradas, tomentuloso-glandulares.

Elemento escaso en la región de estudio, principalmente en bosque tropical caducifolio, creciendo a orilla de arroyos, en el noroeste de Michoacán. Alt. 1650 m. Colectado en floración y fructificación en octubre.

Taxon conocido de Son., Chih., N.L., Tamps., Hgo., Nay., Jal., Col., Mich., Ver.  
(tipo: *L.C. Ervendberg* 343 (GH!)), Oax.

Planta muy escasa, vulnerable a la extinción en la zona de estudio.

**Michoacán:** 10 km al oeste de La Piedad, sobre la carretera a Guadalajara, municipio de La Piedad, *J. Rzedowski* 41218 (ENCB, IEB, MEXU).

## ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PLANTAS

Asteroideae, 2  
Athroismeae, 2  
*Baccharis adnata*, 10, 11  
balagasana, 6  
*Berthelotia*, 6  
*Blumea*, 2  
    *B. secc. Apterae*, 3  
    *B. secc. Caulopterae*, 3  
    *B. viscosa*, 3, 4, 5  
*Caesulia*, 3  
candelón, 6  
canela, 6  
canelilla, 6  
canelón, 6  
Compositae, 1  
*Conyza*, 3, 10  
    *C. carolinensis*, 6  
    *C. salicifolia*, 10  
    *C. viscosa*, 3  
*Cylindrocline*, 6  
*Doellia*, 6  
*Duhaldea*, 3  
flor de Santa María, 6  
guiz-cànÉl, 6  
Heliantheae, 2, 10  
hierba de clavo, 6  
Inuleae, 1, 2  
Inulinae, 2  
jara peluda, 12  
kaxnan may te', 6  
lengua de buey, 6

*Monarrhenus*, 6  
naranjillo, 7  
*Neurolaena lobata*, 10  
*Pentanema*, 3  
*Pluchea*, 2, 6  
    *P. adnata*, 10  
    *P. carolinensis*, 6, 8, 9, 10  
    *P. odorata*, 9  
    *P. purpurascens*, 9  
    *P. salicifolia*, 6, 10  
    *P. salicifolia* var. *canescens*, 10, 12  
    *P. salicifolia* var. *salicifolia*, 10, 12  
    *P. subdecurrens* var. *canescens*, 12  
    *P. symphytifolia*, 10  
Plucheeae, 2  
Plucheinae, 2  
*Pseudoconyza viscosa*, 3  
salve ay, 7  
salvia, 7  
Santa María, 7  
Santa María delgada, 10  
*Tecmarsis*, 6  
*Tessaria*, 6  
ya canel, 7  
yucu ventiadura, 10



## MUNICIPIOS DE GUANAJUATO    MUNICIPIOS DE QUERÉTARO    MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

32 Abasolo  
 43 Acámbaro  
 30 Apaseo El Alto  
 29 Apaseo El Grande  
 7 Atarjea  
 28 Celaya  
 27 Comonfort  
 45 Coroneo  
 36 Cortazar  
 21 Cuerámbaro  
 14 Doctor Mora  
 11 Dolores Hidalgo  
 10 Guanajuato  
 33 Huanímaro  
 22 Irapuato  
 35 Jaral del Progreso  
 44 Jerécuaro  
 25 Juventino Rosas  
 8 León  
 19 Manuel Doblado  
 38 Moroleón  
 1 Ocampo  
 31 Pénjamo  
 23 Pueblo Nuevo  
 17 Purísima del Rincón  
 20 Romita  
 24 Salamanca  
 41 Salvatierra  
 3 San Diego de la Unión  
 2 San Felipe  
 18 San Francisco del Rincón  
 13 San José Iturbide  
 4 San Luis de la Paz  
 12 San Miguel de Allende  
 16 Santa Catarina  
 40 Santiago Maravatío  
 9 Silao  
 46 Tarandacuao  
 42 Tarimoro  
 15 Tierra Blanca  
 39 Uriangato  
 34 Valle de Santiago  
 5 Victoria  
 26 Villagrán  
 6 Xichú  
 37 Yuriria

18 Amealco  
 1 Arroyo Seco  
 11 Cadereyta  
 9 Colón  
 8 El Marqués  
 12 Ezequiel Montes  
 15 Huimilpan  
 2 Jalpan  
 3 Landa  
 16 Pedro Escobedo  
 4 Peñamiller  
 5 Pinal de Amoles  
 7 Querétaro  
 6 San Joaquín  
 17 San Juan del Río  
 13 Tequisquiapan  
 10 Tolimán  
 14 Villa Corregidora

53 Acuitzio  
 24 Álvaro Obregón  
 9 Angamacutiro  
 32 Angangueo  
 36 Coeneo  
 28 Contepec  
 21 Copándaro de Galeana  
 22 Cuitzeo  
 40 Charo  
 34 Cherán  
 33 Chilchota  
 19 Chucándiro  
 6 Churintzio  
 5 Ecuandureo  
 27 Epitacio Huerta  
 47 Erongarícuaro  
 20 Huandacareo  
 18 Huaniqueo  
 51 Huiramba  
 41 Indaparapeo  
 29 Irimbo  
 2 La Piedad  
 50 Lagunillas  
 26 Maravatío  
 38 Morelia  
 44 Nahuatzen  
 3 Numarán  
 10 Panindícuaro  
 43 Paracho  
 49 Pátzcuaro  
 8 Penjamillo  
 15 Purépero  
 11 Puruándiro  
 42 Queréndaro  
 37 Quiroga  
 23 Santa Ana Maya  
 52 Santa Clara del Cobre  
 30 Senguio  
 4 Sixto Verduzco  
 14 Tangancícuaro  
 39 Tarímbaro  
 46 Tingambato  
 31 Tlalpujagua  
 13 Tlazazalca  
 48 Tzintzuntzan  
 45 Uruapan  
 16 Villa Jiménez  
 17 Villa Morelos  
 1 Yurécuaro  
 35 Zacapu  
 12 Zamora  
 7 Zináparo  
 25 Zinapécuaro

